



СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н.А. ВЛАСОВ
14 МАР 2018

ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению вакцины против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец.

((Организация-разработчик - ООО «Агровет», 109472 г. Москва, ул. Ташкентская д.34, корп. 5)

Номер регистрационного удостоверения 77-1-19.12-4049 СТЖР-1-2.1/00660

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата - Вакцина против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец.

Международное непатентованное наименование лекарственного препарата - Вакцина против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец.

2. Лекарственная форма: Суспензия для инъекций.

Вакцина состоит из культуры штамма *Clostridium chauvoei* R₁₅, инактивированная формалином, с добавлением в качестве адьюванта гидроокиси алюминия в количестве 35 %-тов по объему.

В одной иммунизирующей дозе вакцины содержится не менее 10×10^9 микробных клеток культуры вакцинного штамма *Clostridium chauvoei* R₁₅.

3. По внешнему виду вакцина представляет собой суспензию серовато-желтого цвета с быстро выпадающим осадком, легко суспендирующимся при взбалтывании.

Срок годности вакцины 12 месяцев с даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования, и не более двух часов после вскрытия флакона. Вакцина по истечении срока годности к применению не пригодна.

4. Вакцина расфасована по 50 см³ (25 доз); 100 см³ (50 доз); 200 см³ (100 доз) в стеклянные или полимерные флаконы соответствующей вместимости, герметично закупоренные резиновыми пробками, укрепленными алюминиевыми колпачками.

Флаконы упакованы в картонные коробки с разделительными перегородками, обеспечивающими их целостность.

В каждую коробку вложена инструкция по применению вакцины.

5. Вакцину хранят и транспортируют в темном месте при температуре от 2 °С до 8 °С.

6. Вакцину следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Вакцина во флаконах без этикеток, с нарушением целостности и/или герметичности упаковки, с измененным внешним видом, подвергшуюся замораживанию, с истекшим сроком

годности, не использованная в день вскрытия флакона, подлежит браковке, обеззараживанию кипячением в течение 30 минут и утилизируют.

Утилизация обеззараженной вакцины не требует соблюдения специальных мер предосторожности.

8. Отпускается без рецепта

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

9. Фармакотерапевтическая группа: иммунобиологический лекарственный препарат для ветеринарного применения.

10. Вакцина вызывает формирование иммунного ответа к возбудителю эмфизематозного карбункула через 14 суток после однократного введения у взрослых животных и двукратного введения у молодняка продолжительностью не менее 6 месяцев.

Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Вакцина предназначена для профилактики эмфизематозного карбункула у крупного рогатого скота и овец в хозяйствах, угрожаемых и неблагополучных по данной болезни.

12. Запрещено вакцинировать животных клинически больных и/или ослабленных и истощенных за две недели до и после стрижки или хирургических операций.

13. При работе с вакциной следует соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами ветеринарного назначения.

Все лица, участвующие в проведении вакцинации в том числе и вспомогательный персонал, привлекаемый для фиксации животных, должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор и резиновые перчатки) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи.

При попадании вакцины на кожу и слизистые оболочки их промывают большим количеством воды. При случайном введении вакцины человеку необходимо место инъекции обработать любым антисептиком (5%-ным раствором йода или 70%-ным раствором этилового спирта) и обратиться в медицинское учреждение.

В случае разлива вакцины, участок пола или почвы заливают 5 % раствором хлорамина или едкого натрия.

14. . Запрещено вакцинировать животных в течение последнего месяца беременности и в течение 10 суток после отела/окота.

15. Вакцинации подлежат крупный рогатый скот от шести месяцев и старше, телята в возрасте от 3-х месяцев до 4 лет и овцы с 6-ти месяцев.

Вакцину вводят внутримышечно: крупному рогатому скоту в область крупа, овцам - внутренней поверхности бедра в объеме 2,0 см³.

Телят вакцинируют двукратно с интервалом 3 месяца. Взрослых животных – однократно, с интервалом 6 месяцев за 2-3 недели перед выгоном на пастбище и перед постановкой на стойловое содержание.

При установлении в хозяйстве случая заболевания эмфизематозным карбункулом, внеплановой вакцинации подлежит все поголовье животных независимо от срока последнего введения вакцины.

Перед введением вакцину взбалтывают.

Для вакцинации используют шприцы ветеринарные инъекционные или полуавтоматические, стерилизованные кипячением в дистиллированной воде в течение 30 минут.

Место инъекции обрабатывают 70 % -ным раствором этилового спирта.

16. У вакцинированных животных допускается кратковременно повышение температуры тела и угнетенное состояние.

17. Передозировка вакцины не вызывает симптомов проявления эмфизематозного карбункула или других патологических признаков.

18. Запрещается использовать вакцину одновременно с иммунодепрессантами.

19. Следует избегать нарушений схемы проведения вакцинации, поскольку это может привести к снижению эффективности иммунопрофилактики эмфизематозного карбункула.

20. В случае пропуска очередного введения вакцины необходимо провести иммунизацию как можно скорее.

21. Продукты убоя и молоко от вакцинированных животных реализуют без ограничения независимо от срока введения вакцины.

Наименование и адрес производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

Обособленное подразделение ООО «Агровет», 612079 Кировская область, Оричевский район, пгт. Левинцы.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «Агровет», 109472, г. Москва, ул. Ташкентская, д.34, корп. 5.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу «Инструкция по применению формолвакцины против эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец концентрированной гидроокисьалюминиевой», утверждённая Россельхознадзором 23.05.2017 г